
16. Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Диагонали AC и BD пересекаются в точке O, а прямые AB и CD – в точке K. Прямая KO пересекает стороны BC и AD в точках M и N соответственно, и угол BAD равен 30^0. Известно, что в трапеции ABMN и NMCD можно вписать окружность.

А) Докажите, что треугольник AKD тупоугольный.

Б) Найти отношение площадей треугольника BKC и трапеции ABCD



Решение. Вар. 232

А) Рассмотрим две пары подобных тр-в:

1) $\triangle ACN \sim \triangle COM$ и $\triangle DON \sim \triangle BOM$ по двум (отмечен.) углам. Получим,

$\frac{AN}{MC} = \frac{ON}{MO}$ и $\frac{DN}{BM} = \frac{ON}{MO} \Rightarrow \frac{AN}{MC} = \frac{DN}{BM} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{AN}{DN} = \frac{MC}{BM}$ (1)

2) $\triangle AKN \sim \triangle BKM$ и $\triangle DKN \sim \triangle CKM$ [K-общ., $\angle A = \angle B$. // K-общ., $\angle D = \angle C$.]

$\frac{AN}{BM} = \frac{KN}{KM}$ и $\frac{DN}{MC} = \frac{KN}{KM}$,

отсюда имеем $\frac{AN}{BM} = \frac{DN}{MC} \Leftrightarrow \frac{AN}{DN} = \frac{BM}{MC}$ (2). Из (1) и (2) $\Rightarrow \frac{MC}{BM} = \frac{BM}{MC}$, т.е. равны два взаимно обратных (положит.) числа. След., каждое из них равно единице, т.е. $\frac{BM}{MC} = 1 \Rightarrow BM = MC$. Из (1) (и (2)) $\Rightarrow$, что $\frac{AN}{DN} = 1$, т.е. $AN = DN$.

Т.е., прямая KO делит основания трапеции пополам.

Т.к. в ч-хугольники ABMN и NMCD можно вписать окр-ти, то $BM + AN = AB + MN$ и $MC + ND = CD + MN$. Вычтем полученные ра-ва. Учитывая доказанное (M и N – середины оснований), получим $AB - CD = 0$, т.е. $AB = CD$. След., трапеция (данная) равнобедр. След. $\angle A = \angle B$, и т.к. $\angle A = 30^0$, то $\angle K$ (тр-ка AKD) $= 180^0 - 2 \cdot 30^0 = 120^0$, т.е. тупой, что и т.д.

2018. 4 11

б) Т.к. $\angle A = \angle B$, то $\triangle AKD$ равнобедр. и, след., медиана KN явл. одновременно и высотой (и бис.)

Т.к. $AD \parallel BC$, а окр-ти их касаются, то радиусы этих окр. одинаковы.

Пусть r - радиус окр-тей, тогда $BH = 2r$ - высота трапеции; $MN = BH = 2r$.

$AB = \frac{BH}{\sin A} = \frac{2r}{\sin 30^\circ} = 4r$ ($\triangle ABH$, $\angle H = 90^\circ$, $BH = 2r$), $AH = AB\cos A = 4r \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2r\sqrt{3}$.

Т.к. $HN = BM$, то из св-ва описанного 4-х-ка имеем $AH + 2BM = AB + MN \Rightarrow$

$2BM = AB + MN - AH$; $2BM = 4r + 2r - 2r\sqrt{3}$; $BM = 3r - r\sqrt{3} = r(3-\sqrt{3})$ $(= \frac{1}{2}BC)$.

$AN = AH + HN = 2r\sqrt{3} + 3r - r\sqrt{3} = r\sqrt{3} + 3r$ $(= \frac{1}{2}AD)$

$S_{трапец.} = (AN + BM) \cdot MN = (r\sqrt{3} + 3r + 3r - r\sqrt{3}) \cdot 2r = 12r^2$.

$\triangle BKC$: высота $KM = BM \operatorname{tg} \angle B = r(3-\sqrt{3})/\sqrt{3}$. $S_{BKC} = \frac{1}{2}BC \cdot KM = \frac{r^2(3-\sqrt{3})^2}{\sqrt{3}} = \frac{r^2(12-6\sqrt{3})}{\sqrt{3}}$;

$S_{BKC} = \frac{6r^2(2-\sqrt{3})}{\sqrt{3}} = \frac{6r^2(2\sqrt{3}-3)}{3} = 2r^2(2\sqrt{3}-3)$.

$\frac{S_{BKC}}{S_{ABCD}} = \frac{2r^2(2\sqrt{3}-3)}{12r^2} = \frac{2\sqrt{3}-3}{6}$.

Ответ: $\frac{2\sqrt{3}-3}{6}$.

2018 4 11