
№8, вар. 378. Часы показывают 2 ч 25 мин. Через сколько минут минутная стрелка в 9-й раз поравняется с часовой?

Решение.



Циферблат цифрами разбит на 12 секторов, центральные углы которых $\alpha = \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$, минутная стрелка дугу одного сектора 9 раз обошла за 1 ч 5 мин $\Rightarrow V_{\text{мин. стр.}} = \frac{30^\circ}{5\text{ мин}} = 6^\circ/\text{мин}$.

Часовая стрелка — за 1 ч = 60 мин. $\Rightarrow V_{\text{час. стр.}} = \frac{30^\circ}{60\text{ мин}} = \left(\frac{1}{2}\right)^\circ/\text{мин}$

Скорость сближения $V_{\text{сбл.}} = 6^\circ/\text{мин} - \left(\frac{1}{2}\right)^\circ/\text{мин} = 5{,}5^\circ/\text{мин}$ (движение вдогонку)

Т. B — 2 ч 25 м. От положен. 2 ч до т. B часовая стрелка повернётся на $\left(\frac{1}{2}\right)^\circ \cdot 25 = 12{,}5^\circ \Rightarrow \angle AOB = 60^\circ + 12{,}5^\circ = 72{,}5^\circ$, а угол между стрелками $\angle BOC = 150^\circ - 72{,}5^\circ = 77{,}5^\circ$.

Следовательно, начальный путь S_0 между мин. и часовой стрелкой (для 1-го сближения) $S_0 = 360^\circ - 77{,}5^\circ$, а весь путь для 9-ти кратного сближения будет $S = S_0 + 360^\circ \cdot 8$. Следовательно, искомое время

$$T = \frac{S}{V_{\text{сбл.}}} = \frac{(360^\circ - 77{,}5^\circ) + 360^\circ \cdot 8}{5{,}5^\circ/\text{мин}} = \frac{360^\circ \cdot 9 - 77{,}5^\circ}{5{,}5} =$$

$$= \frac{3240^\circ - 77{,}5^\circ}{5{,}5^\circ/\text{мин}} = \frac{3162{,}5^\circ}{5{,}5^\circ/\text{мин}} = 575\text{ мин.} — \text{ответ.}$$

№14, вар. 378. Решить неравенство:

$$\frac{36^x - 6^{x+1} + 3}{6^x - 5} + \frac{6^{x+1} - 39}{6^x - 7} \le 6^x + 5.$$

Решение. Сделаем замену $6^x = t$, получим

$\frac{t^2 - 6t + 3}{t-5} + \frac{6t - 39}{t-7} \le t + 5$. В левой части нер-ва неправильные рац. дроби (степень числ. $\ge$ с. знам.) Преобразуем эти дроби, выделив целую часть

$$\frac{t^2 - 6t + 3}{t-5} = \frac{(t^2 - 5t) - (t-5) - 2}{t-5} = \frac{t(t-5) - (t-5) - 2}{t-5} =$$


(поделим почленно) $= t - 1 - \frac{2}{t-5}$;

$$\frac{6t - 39}{t-7} = \frac{(6t - 42) + 3}{t-7} = \frac{6(t-7) + 3}{t-7} = 6 + \frac{3}{t-7}.$$

Данное нер-во: $t - 1 - \frac{2}{t-5} + 6 + \frac{3}{t-7} - t - 5 \le 0$

$$\frac{3}{t-7} - \frac{2}{t-5} \le 0; \quad \frac{3t - 15 - 2t + 14}{(t-7)(t-5)} \le 0$$

$$\begin{cases} \frac{t-1}{(t-7)(t-5)} \le 0 \\ t > 0 \text{ (показат. функция)} \end{cases}$$



$\left[\begin{array}{l} 0 < t \le 1 \\ 5 < t < 7 \end{array}\right.$, вернёмся к x: $\left[\begin{array}{l} 6^x \le 1 \\ 5 < 6^x < 7 \end{array}\right.$, $\left[\begin{array}{l} 6^x \le 6^0 \Rightarrow x \le 0 \\ \log_6 5 < x < \log_6 7 \end{array}\right.$,

осн. $6 > 1 \Rightarrow$ знак для ф-ции и для аргумента не меняется.

Ответ: $x \in (-\infty; 0] \cup (\log_6 5; \log_6 7)$.